

NOTE XIV.

DESCRIPTION DE TROIS ESPÈCES NOUVELLES
DE COLÉOPTÈRES

PAR

A. GROUVELLE.

Pseudotarphius Pasteuri, n. sp.

Oblongus, convexus, opacus, nigricans, nigro-setosus et flavo-fasciatus; prothorace transverso, cordiformi, disco fasciculato; elytris oblongis, lineato-setosis, antice et postice flavo-fasciatis; antennis pedibusque rufo-fuscis. — Long. 2 à 2 $\frac{1}{2}$ mill.

Oblong, convexe, opaque, noir, garni de soies dressées noires, entremêlées de quelques soies claires, présentant sur les élytres, dans la région scutellaire et vers le sommet, quelques fascicules d'un jaune blanchâtre, formées de squamules serrées et couchées. Antennes roux brunâtres, 3^{me} article allongé, 4^{me} et 9^{me} un peu plus longs que larges; massue ovale. Tête transversale, subdemi-circulaire, profondément et grossièrement ponctuée, soies dressées en général claires, yeux garnis de soies. Prothorax plus de deux fois plus large que long, fortement cordiforme, marge antérieure un peu épaissie dans le milieu, fortement sinuée de chaque côté, marges latérales concaves, bordées de soies serrées; ponctuation semblable à celle de la tête; sur le disque quatre groupes de soies dressées et serrées, disposées sur une ligne transversale; base rebordée. Ecusson ponctiforme. Elytres plus larges que le prothorax, une fois et un

Notes from the Leyden Museum, Vol. XX.

quart aussi longs que larges ensemble, présentant leur plus grande largeur au delà du milieu, acuminés ensemble, finement ponctués en lignes, points peu serrés, portant chacun une soie dressée; intervalles plans, lisses, à peine ondulés; calus huméral fasciculé. Sillons antennaires convergents en dedans. Pattes roux brunâtres.

Hab. Poentjak: Java occidental (Pasteur). — Collection du Musée de Leyde.

Pseudotarphius Fruhstorferi, n. sp.

Oblongus, convexus, opacus, nigro-castaneus, nigro vel rufo hispidus, flavo-squamoso fasciatus; prothorace transverse cordiformi, disco in longitudinem sulcato; elytris lineato-setosis, intervallis linearum 4 à 5 et 8 à 9 latioribus; antennis pedibusque rufo-fuscis. — Long. 3 à 3½ mill.

Oblong, convexe, opaque, brun marron, couvert de courtes soies dressées, en général noires mais par places fauves et formant de chaque côté du disque du prothorax, sur les calus huméraux et de chaque côté de l'écusson des groupes de soies plus serrées. Antennes brun-rougeâtres, moniliformes, 3^{me} article plus long que large, massue oblongue. Tête granuleuse, subrectangulaire, bord antérieur largement arrondi. Prothorax plus de deux fois plus large que long, fortement cordiforme, largement sillonné et impressionné dans la longueur; marge antérieure fortement sinuée de chaque côté, chargée en avant de soies serrées; marges latérales frangées de soies concaves, disque gibbeux, garni en dehors de soies noires, dressées, soies squamiformes fauves, assez serrées; base rebordée. Elytres un peu plus larges que le prothorax, environ aussi longs que larges ensemble, acuminés ensemble au sommet, ponctués-striés, garnis à la base de courtes soies squamiformes, dressées, fauves, et sur le reste de la surface de soies noires, dressées, disposées par groupes de 4 lignes, déterminant des intervalles plus larges, donnant l'apparence de côtes longitudinales peu saillantes; sur le disque quelques

petites macules formées de squamules blanchâtres, couchées. Sillons antennaires presque nuls.

Hab. Lompa-Battau: Célèbes mérid. (Fruhstorfer). — Collection du Musée de Leyde.

Sostea pilula, n. sp.

Breviter oblonga, convexa, picea, setulosa; prothorace transverso, antice angustato, dense profunde valdeque punctato, flavo-griseo squamulato; clytris brevibus, valde lineato-punctatis, intervallis linearum angustioribus punctis. — Long. $2\frac{1}{4}$ mill.

Oblong, court, très convexe, brun de poix, garni de longs poils dressés, peu serrés, un peu plus épais au sommet. Tête et prothorax couverts de squamules filiformes d'un jaune cendré. Prothorax environ deux fois aussi large que long, un peu rétréci au sommet, couvert d'une grosse ponctuation serrée qui laisse une étroite bordure lisse le long de la base. Ecusson à peine visible. Elytres de la largeur du prothorax à la base, ovales, acuminés ensemble au sommet, environ une fois et un quart aussi longs que larges ensemble dans la plus grande largeur, couverts d'une grosse ponctuation disposée en lignes, laissant des intervalles plus étroits que les points, marge basilaire relevée en un étroit bourrelet. Pattes longues, garnies de soies, rougeâtres, tarsi plus clairs.

Hab. Pengalengan: Java occidental (Fruhstorfer). — Musée de Leyde et collection Grouvelle.

Paris, 13 Mars 1898.